

COLLECTIONS RECUEILLIES PAR M. M. DE ROTHSCHILD
DANS L'AFRIQUE ORIENTALE.
HOMOPTÈRES,

PAR M. LE D^r L. MELICHAR, DE VIENNE (AUTRICHE).

Thamnotettix puellus nov. sp.

Corps petit, élancé. Dessus mat, de coloration grisâtre. Vertex arqué en avant, plus long dans le milieu que sur les côtés, jaunâtre pâle avec cinq petits points bruns sur le bord du vertex et quatre traits longitudinaux sur le cou, qui sont reliés en avant l'un à l'autre par un trait transversal. Front allongé, avec d'imperceptibles stries transversales brunes, et, de chaque côté, sur les tempes, deux petits points bruns. Antennes jaune pâle. Clypeus, lora et joues sans taches. Pronotum grisâtre, avec cinq à six rangs de bandes longitudinales formées par des traits transversaux. Écusson imperceptiblement tacheté et ponctué. Élytres allongés avec des nervures jaunes claires bordées de taches et de petits points bruns, de sorte que des taches arrondies, d'un blanc grisâtre et de grandeur variée, se montrent dans les cellules. Ailes brun gris avec des nervures foncées. Poitrine plus ou moins tachetée de brun. Dos de l'abdomen noir. Ventre jaune pâle, offrant une tache noire transversale à la base du premier segment. Pattes jaune pâle, les cuisses antérieures et intermédiaires avec un anneau de couleur foncée avant l'extrémité, les postérieures avec quelques points noirs à l'apex. Des points noirs à la base des épines des tibias intermédiaires et postérieurs.

♀ Longueur : 3 millimètres.

1 ♀ recueillie en mai au mont Karoli.

Thamnotettix bipunctatus nov. sp.

Jaune pâle. Vertex arrondi, avec deux grands points noirs, qui sont entourés d'une auréole claire et qui sont situés tout près des yeux. Entre ceux-ci on rencontre souvent une ligne d'un jaune ferrugineux. Vertex allongé, jaune ferrugineux, avec d'imperceptibles lignes transversales plus foncées et avec une ligne claire longitudinale dans le milieu, qui s'élargit en arrière en forme de crosse. La moitié inférieure du clypeus noire. Joux, lora, tempes jaune pâle. Le pronotum jaune grisâtre, plus clair sur la marge antérieure. Écusson avec de grands triangles bruns dans les angles basilaires. Élytres sans dessin, transparents, jaune brunâtre, les nervures jaunâtre clair, fortement saillantes. La nervure du bord costal jaune pâle. Ailes jaune pâle, dessous et pattes jaune pâle. Milieu de la poitrine noir.

Bord postérieur du dernier segment abdominal ♀ noir au milieu, où il présente une entaille à angle aigu.

♀ Longueur : 5 millimètres.

Afrique orientale, mont Nyro, Ouganda, mont Loroghi.

***Athysanus fasciolatus* nov. sp.**

Ressemblant à l'*Athysanus striola* Fall., mais d'un blanc d'ivoire. Vertex plus large que long en son milieu, où il est plus long que sur les côtés, son bord antérieur obtusément arrondi. Surface du vertex convexe, avec une ligne transversale noire interrompue au milieu, allant d'un œil à l'autre. À cette ligne transversale est jointe, en arrière, une bande transversale diffuse, de couleur de rouille, qui est également interrompue au milieu. Face blanc jaunâtre pâle, marqué sur le front de stries transverses jaunes à peine perceptibles. Clypeus rétréci visiblement au sommet. Au milieu de la suture loréale, un point noir très petit. Rostre court. Antennes jaune blanchâtre. Pronotum subsemi-circulaire, blanc jaunâtre en avant, avec plusieurs taches jaunes imperceptibles, en arrière grisâtre blanc finement strié transversalement. Écusson avec un triangle, d'un noir profond, dans chacun des angles basilaires et caché en partie par la marge postérieure du pronotum. Élytres dépassant l'abdomen, hyalins, à nervures fines et jaunâtres. Ailes hyalines, irisées, à nervures jaunâtres. Dos brun, dessous et pattes blanc jaunâtre.

♂ Valvula genitalis triangulaire, laminae genitales triangulaires allongées, les bords internes ne se joignant pas l'un à l'autre.

♀ Le bord postérieur du dernier segment abdominal droit. Vagina dépassant le coleostéron, jaunâtre pâle, brun à l'extrémité.

♂ ♀ Longueur : 3 à 4 millimètres. Mont Nyro.

***Athysanus similis* nov. sp.**

Très voisin de l'*Athys. fasciolatus*, mais différent par les segments génitaux. La ligne transversale noire sur le vertex est plus étroite, et n'est pas limitée en arrière par une zone jaune ferrugineux. Le front présente des stries transversales noires, qui sont raccourcies vers le milieu; sur la suture du clypeus et du front, deux petits points noirs; côtés du prothorax plus ou moins tachetés. Dessus de l'abdomen brun noir; ventre en partie orné de macules foncées. Élytres comme chez le *fasciolatus*. Pattes jaune pâle, cuisses couvertes de petits points et d'atomes. Tibias postérieurs avec des stries longitudinales foncées au côté interne, le dernier article des tarses foncé.

♀ Marge postérieure du dernier segment abdominal droite, dentelée au milieu, où se trouve une tache marginale noire.

♂ Valvula genitalis triangulaire, laminae genitales allongées, triangulaires. Les bords internes divergents.

Longueur du mâle et de la femelle : 3 à 4 millimètres. Harrar.

***Allygus triguttatus* nov. sp.**

Brun jaunâtre marqué de noir. Vertex obtus, arrondi vers le front noir orné d'un dessin clair, en particulier d'une ligne en forme d'arc au bord du vertex, ligne qui se trouve réunie au milieu avec un point situé en arrière; de chaque côté du point, une tache transversale située presque au milieu du disque; au milieu du cou deux traits longitudinaux parallèles et, de chaque côté, une petite tache. Front brun de poix avec des traits clairs transversaux et une ligne longitudinale au milieu. Clypeus en carré allongé, avec un trait noir au milieu. Lora marginée de noir; fossettes antennaires noires, au-dessus de celles-ci une tache claire. Antennes brunes. Pronotum deux fois aussi long que le vertex, finement strié en travers, marqué de points noirs près du bord antérieur et moucheté de noir sur la moitié postérieure. Écusson imperceptiblement taché et offrant deux taches marginales claires avant l'extrémité. Élytres allongés, avec des nervures brunes et de nombreuses petites taches et traits entre celles-ci. Au clavus, trois points opaques en demi-cercle qui forment trois taches rondes lorsque les élytres sont fermés. Ailes enfumées avec des nervures brunes. Poitrine et ventre brun de poix, les bords des segments abdominaux étroitement bordés de jaune. Cuisses marquées de lignes noires; tibias ponctués de noir, particulièrement les tibias postérieurs. Extrémité des articles tarsaux brune. Bord postérieur du dernier segment abdominal échancré en arc de cercle au milieu.

♀ Longueur : 7 millimètres. Recueillie dans l'Afrique orientale, à Lum-bawa, en septembre.

***Deltocephalus ornatulus* nov. sp.**

Corps allongé, jaune pâle marqué de brun ferrugineux. Vertex triangulairement saillant, bombé en haut, jaune pâle offrant au bord antérieur un dessin brun ferrugineux, qui limite trois taches claires arrondies. La tache médiane est située sur l'extrémité du vertex. Sur le cou, une ligne longitudinale courte et fine ayant de chaque côté une tache presque carrée et légèrement brun ferrugineux. Face d'un brun ferrugineux. Pronotum aussi long que le vertex, arqué en avant, de coloration grisâtre, le bord antérieur jaunâtre. Écusson jaune pâle, offrant de chaque côté, dans l'angle basilaire, un triangle jaune ferrugineux. Élytres dépassant l'extrémité de l'abdomen, avec des nervures jaunâtres grêles, les cellules couvertes de petites taches brun ferrugineux et d'atomes; seulement par places, on aperçoit de petites taches grisâtres; en particulier sur le clavus, à l'extrémité de la suture, trois petites taches semi-lunaires formant avec chacune des taches

opposées de petites taches rondes. Ailes brunâtres. Poitrine et ventre, ainsi que les pattes, d'un jaune ferrugineux pâle; des points foncés à la base des épines des tibias postérieurs.

♀ Longueur : 2,5 millim. Mont Karoli.

***Phlepsius quadripunctatus* nov. sp.**

Corps allongé, rétréci en arrière. Dessus blanc jaunâtre pâle, mat, avec un dessin jaune ferrugineux. Vertex deux fois aussi large que long au milieu, arrondi en avant, son bord tranchant, impressionné transversalement en arrière du bord, jaune ferrugineux, avec quatre points noirs, savoir : un point de chaque côté, près du bord interne de l'œil, et deux points sur le bord du vertex, c'est-à-dire au bord supérieur du front. Ces derniers points sont plus grands et placés plus près l'un de l'autre que les points du vertex. Front allongé, visiblement rétréci en arrière, jaune pâle, avec des stries transversales imperceptibles d'un jaune ferrugineux. Clypeus plus long que large, rétréci à la base, arrondi en bas. Lora allongées, semi-lunaires. Antennes jaune pâle. Pronotum avec quatre traits longitudinaux d'un jaune ferrugineux, les traits externes souvent indistincts. Écusson marqué de triangles d'un brun ferrugineux aux angles basilaires et d'une tache carrée qui atteint l'impression transverse. Élytres allongés. Nervures fortes, d'une coloration jaune ferrugineux, cependant décolorées en certains endroits, en sorte qu'il existe deux grandes taches claires à la marge costale. La première tache marginale a la forme d'un triangle; la deuxième, celle d'une demi-lune. Au clavus se trouvent deux nervures reliées l'une à l'autre par une nervure transversale. De la nervure externe du clavus partent une ou deux nervures transverses allant jusqu'à la sutura clavi. Ailes hyalines. Dessous et pattes sans dessin.

Longueur : 6 millimètres. Recueillis sur le mont Nyro, dans l'Afrique orientale.

***Phlepsius tumidus* nov. sp.**

Cette espèce appartient au groupe des *Phlepsius*, qui se distinguent par le bord peu tranchant du vertex, qui est cependant plus arrondi et qui se rapproche de celui de l'*Allygus*. Corps d'un jaune ferrugineux, marqué de noir. Vertex obtusément triangulaire, plus long au milieu que sur les côtés, convexe vers le haut avec une ligne médiane courte et profonde sur le cou. Front presque en ovale allongé, tacheté de noir. Clypeus rétréci à la base, marqué de taches plus ou moins foncées, ainsi que les lora et les joues. Pronotum strié transversalement, convexe, marqué de rares taches noires. Écusson triangulaire, avec une ligne transverse au milieu et, de chaque côté, un point marginal noir placé avant l'extrémité. Élytres avec de nombreuses nervures transversales brunes, fines, ramifiées et formant par endroits un dessin foncé. Notamment au milieu du clavus se trouve un pareil

dessin foncé de forme triangulaire dont la base est située sur la sutura clavi, son extrémité dirigée vers l'extrémité de la suture. En outre, il existe plusieurs taches noires, dont un petit point en arrière du milieu du clavus et une grande tache à l'extrémité de celui-ci. Quatre à cinq taches noires se trouvent sur le bord costal. Ailes d'un blanc laiteux. Pattes d'un jaune ferrugineux; cuisses tachetées de noir; tibias avec quatre points noirs; extrémité des tarses noire.

Longueur : 6 millimètres. Mont Nyro, Afrique orientale.

Phlepsius pallidus nov. sp.

Jaune pâle. Le bord du vertex tranchant par une ligne noire, à laquelle se joint une teinte jaune orange diffuse. Tout le reste du corps, en dessus et en dessous, unicolore. Les élytres sont presque transparents avec des nervures claires, sans nervures transverses ramifiées. Ailes hyalines. Valvula genitalis triangulaire, laminae genitales triangulaires, allongées, accolées l'une à l'autre, brusquement rétrécies à l'extrémité, prolongées vers le haut en une pointe légèrement recourbée.

♂ Longueur : 6-6,5 millim. Mont Nyro, Afrique orientale.

Selenocephalus irroratus nov. sp.

Corps robuste et ramassé, de facies semblable à celui de l'espèce paléarctique *Selenocephalus obsoletus* Derm. Dessus brun jaunâtre très brillant, à dessin noir accentué. Tête large, vertex presque trois fois aussi large que long au milieu, le bord antérieur tranchant, avec un sillon dans lequel se trouvent les ocelles, tout près du bord des yeux. Face large, tachetée et striée de noir. Le vertex ainsi que le pronotum, l'écusson et les élytres densément marqués de nombreux traits et taches; notamment dans les cellules des élytres, le dessin foncé est très dense, arborisé par places; on aperçoit seulement au bord de la poitrine, en arrière du milieu, une tache claire triangulaire et, derrière celle-ci, deux autres petites taches marginales sans dessin. Ailes brun de fumée. Dessous taché de brun; les pattes fortement tachées de noir; de grands points noirs à la base des épines sur les tibias postérieurs.

♂ Longueur : 6 millim. Mont Nyro.

Selenocephalus clypeocarinatus nov. sp.

Tête aussi large que le pronotum. Vertex obtusément triangulaire, tranchant en avant, offrant au bord antérieur un sillon derrière lequel le vertex est transversalement impressionné, le bord limité par une fine ligne noire, qui est élargie et diffuse en arrière. Au-dessous du sillon existe une ligne transversale noire qui s'élargit sur le front. Disque de celui-ci marqué de chaque côté de deux à trois lignes transversales plus claires. L'extrémité du front, rétrécie inférieurement, est brunâtre. Clypeus étroit

à la base, offrant au milieu une carène longitudinale courte distincte, ce qui différencie particulièrement cette espèce. Les autres parties de la face d'un jaune pâle. Fossettes antennaires noires. Antennes jaune pâle. Pronotum presque aussi long que le vertex au milieu, strié transversalement et couvert de taches noires. Élytres jaune brun, les nervures fines et brunes; cellules avec des taches brunes isolées. Au milieu du clavus, à l'extrémité de la suture, une tache ronde, blanche, opaque. Ailes hyalines avec des nervures brunâtres. Dessous sans tache. Cuisses et tibias avec des rangées de points noirs. De grands points noirs à la base des épines sur les tibias postérieurs.

♂ Longueur : 5,5 millim. Afrique orientale, Makanissa, Ouganda, mont Loroghi.

***Idiocerus funereus* nov. sp.**

Corps court, ramassé. Dessus brun foncé, tacheté de nombreux petits points et taches opaques. Vertex étroit, arqué, jaune ferrugineux comme le front, couvert de nombreuses petites taches brunes et noires, qui sont plus denses à la partie inférieure du front. Joues, lora et clypeus tachetés de même. Pronotum marqué de marbrures foncées très accentuées, la coloration foncée prédominant. Écusson jaune ferrugineux, avec des triangles foncés dans les angles basilaires et de petites taches foncées et irrégulières sur le disque. Élytres brun foncé, marqués de nombreux points opaques blancs plus ou moins étendus disposés presque en rangées. Des points semblables se trouvent également sur le bord costal et sur les nervures. Au clavus existe, en arrière du milieu, une tache transversale blanche calleuse qui s'unit à la tache homologue. Sur la corie, à la même hauteur que la tache dont il vient d'être question, existe une deuxième tache transversale. Membrane enfumée. Ailes enfumées. Dessous tacheté de noir. Ventre noir, les bords des segments étroitement bordés de blanc. Cuisses noires, leur extrémité blanche; tibias noirs avec des points blancs, leur base et leur extrémité d'un blanc jaunâtre; les extrémités des articles des tarses et les ongles noirs.

Longueur : 4 millimètres. Afrique orientale, mont Karoli. Recueilli au mois de mai.

***Pediopsis sexpunctata* nov. sp.**

Vert, de la forme et de la grandeur de notre *P. virescens* Fab. Vertex marqué de trois points noirs, celui du milieu se trouvant à l'extrémité. Sur le bord antérieur du pronotum trois points noirs, l'un à l'extrémité du pronotum qui s'avance en forme de triangle, les autres de chaque côté, derrière l'œil. Écusson triangulaire, avec une ligne transversale profonde au milieu, et, de chaque côté, dans les angles basilaires, un point noir qui touche au bord postérieur du pronotum. Élytres verts, les nervures fortes d'un blanc ver-

dâtre, les cellules d'une couleur un peu brônâtre. Ailes hyalines. Dessous vert, avec un petit point noir sur les côtés, à la partie antérieure de la poitrine. Pattes vertes, les tibias antérieurs et intermédiaires jaunâtres.

♀ Longueur : 4 millimètres. Afrique orientale, Rendilé, mont Karoli. Recueillie en mai.

***Pediopsis æthiopica* nov. sp.**

Très petite espèce, de couleur blanche et brillante comme de l'argent. Vertex très étroit, anguleux; front convexe, couvert, comme le vertex, de petits points noirs denses. Pronotum avançant en forme de triangle, strié obliquement en avant jusqu'à l'extrémité, couvert de petits points denses, et offrant au milieu une fine ligne longitudinale noire. Yeux rouges. Écusson triangulaire marqué de mouchetures denses et montrant, de chaque côté, dans les angles basilaires une grande tache triangulaire brune. Élytres blanches, transparents, à nervures blanches, qui portent de gros points noirs, de même que le bord costal. De nombreux petits points noirs et bruns forment, sur les élytres, trois bandes transversales peu distinctes, savoir une bande transversale à la base, une deuxième en avant du milieu, la troisième en arrière du milieu. Ailes hyalines. Dessus avec des mouchetures foncées, dessous plus ou moins tacheté. Pattes blanc jaunâtre; cuisses densément ponctuées; tibias avec des anneaux noirs. Ongles noirs.

♀ Longueur : 3 millimètres. Éthiopie méridionale, Ouomber.

***Agallia harrarensis* nov. sp.**

Très semblable à l'*Agallia venosa* Fall. Brun jaunâtre. Sur le vertex deux grands points noirs, qui sont plus éloignés l'un de l'autre que chacun d'eux l'est du bord de l'œil. Entre les yeux s'étendent sur le front deux traits longitudinaux bruns placés parallèlement l'un à l'autre. De l'extrémité du front s'étend, de chaque côté vers le dehors jusqu'à la fosse antennaire, un trait oblique en angle obtus; en dessous de cette cavité antennaire, dans la partie inférieure du front, existent deux traits longitudinaux formés par de petits points bruns. Entre le point du vertex et le bord interne de l'œil se trouve une tache longitudinale brune. Fosses antennaires noires; antennes brunes. Pronotum finement strié transversalement, marqué de deux grandes taches arrondies effacées et par suite indistinctes, dans l'intervalle desquelles existe un trait longitudinal raccourci en avant et en arrière; au bord antérieur une tache semi-circulaire de même coloration, dans l'angle interne de laquelle se trouve un point noir. Écusson triangulaire avec des triangles noirs aux angles basilaires. Élytres jaune brun, recouvrant presque l'extrémité de l'abdomen; nervures brunes; trois lignes brunes sur l'extrémité de la suture; l'extrémité de la suture est brune et interrompue en deux endroits. Ailes d'un blanc de lait trouble. Poitrine plus ou moins

foncée. Ventre non tacheté. Pattes brun jaune; cuisses et tibias avec des anneaux bruns indistincts.

♀ Longueur : 4 millimètres. Harrar.

Macropsis viridula nov. sp.

Verte. Vertex étroit, cinq fois aussi large que long, de largeur uniforme, arrondi vers le front. Pronotum fortement rayé transversalement. Écusson avec une ligne transversale anguleuse au milieu. Elytres grossièrement ponctués, moins distinctement ponctués à l'extrémité, hyalins et, comme les nervures, teintés de vert. Dessous et pattes verts.

♀ Longueur : 5 millim. 5. Lac Rodolphe.

Poophilus abbreviatus nov. sp.

Semblable au *P. terrenus* Walk. mais avec le corps plus court et plus ramassé. Dessus brun, pubescence dense, courte et soyeuse, avec de nombreuses taches noires, qui se fondent çà et là en formant de plus grandes taches. Vertex triangulaire, avancé en pointe, aussi long au milieu que large à la base entre les yeux. Bord antérieur noir, caréné, avec quatre petits points jaunâtres. Dessous brun, à pubescence courte et très dense. Front aplati longitudinalement au milieu et présentant, de chaque côté, une rangée de sillons transversaux. Antennes brunes. Élytres courts, dépassant un peu l'extrémité de l'abdomen, offrant leur maximum de largeur au milieu où le bord costal est un peu réfléchi, rétrécis en arrière et en pointe obtuse. Les nervures indistinctes. Ailes brunes. Pattes brunes, les extrémités des épines des tibias postérieurs et les ongles noirs.

♂ ♀ Longueur : 8 millimètres; largeur maxima des élytres : 4 millimètres. Afrique orientale, Nairobi. Recueillis en août.

Clovía albomarginata nov. sp.

Semblable à l'espèce paléarctique *Philenus spinarius* L. pour la taille et le facies. Dessus couvert d'une pubescence extrêmement courte et soyeuse, les nervures des élytres et le bord marginal de ceux-ci plus clairs, presque d'un blanc jaunâtre. À l'extrémité du clavus un point noir et brillant. Vertex aussi long que le pronotum, faiblement convexe; bord antérieur à arête vive; sa région discoïdale offrant une ligne médiane faiblement imprimée qui se continue aussi sur le pronotum. De chaque côté, une ligne longitudinale brun foncé s'étend également de l'extrémité du vertex au scutellum. Ocelles situées sur le cou, plus rapprochées entre elles que chacune d'elles n'est écartée du bord interne de l'œil. Dessous brun foncé offrant de chaque côté une bande longitudinale jaunâtre commençant à l'extrémité du front et prolongée en arrière. Front convexe, ovale, jaunâtre, avec des stries transversales brunes et brun foncé sur la moitié inférieure. Abdomen

en dessus et en dessous d'un brun foncé tendant vers le brun de poix. Pattes brunes.

♂ Longueur : 6 millimètres. Recueilli au Sud du lac Rodolphe.

Dictyophara suturalis nov. sp.

Jaune pâle. Tête prolongée en une apophyse conique, courte et un peu relevée. Vertex triangulaire, pointu, ses bords latéraux carénés, distinctement sinué avant l'extrémité. Surface du vertex avec une carène médiane distincte. Front allongé, avec trois carènes longitudinales, les latérales atteignant la suture du clypeus, rapprochées de la médiane; celle-ci prolongée sur le clypeus. Yeux bruns, rayés de lignes arquées longitudinales de coloration foncée. Sur les côtés du pronotum, derrière les yeux, se trouvent deux carènes longitudinales, et une troisième sur le lobe pectoral du pronotum. Toutes les carènes de la tête et du thorax sont d'un blanc clair. Élytres hyalins, transparents, les nervures longitudinales jaunâtres, brunes à la partie apicale où existent de nombreuses nervures transversales. En outre, la nervure externe longitudinale et le bord sutural interne du clavus sont noirs. Ailes hyalines. Dessus et dessous d'un jaune pâle comme les pattes, les extrémités des tibias antérieurs et intermédiaires et tous les tarses bruns. Extrémités des épines des tibias postérieurs noires. Tibias postérieurs armés de quatre épines. Appareil génital du mâle noir.

♂ Longueur : 9 millimètres. Afrique orientale, mont Nyro.

Cixius stigmatalis nov. sp.

Tête, pronotum et écusson d'un brun jaune. Vertex deux fois aussi large que long, arrondi en avant. Front et clypeus brun jaune sans aucun dessin. Élytres hyalins à nervures blanches couvertes de granules noirs très fins. Nervures apicales un peu jaunâtres, à granules noirs plus forts. Nervures transversales brunes; des points isolés enfumés ou noirs sur les nervures apicales et dans les bifurcations des nervures longitudinales de la corie et du clavus. Le bord costal couvert au bord interne de granules noirs de grosseur uniforme, qui ne sont pas plus forts que ceux des nervures longitudinales. Stigma blanc, brun au côté interne. Ailes hyalines. Dessous et pattes jaune brun. Abdomen d'un brun de poix tirant sur le noir, les bords des segments plus clairs.

Longueur : 5 millimètres. Afrique orientale : Makanissa. 1 ♀.

Oliarus longipennis nov. sp.

Corps grand, étroit et allongé. Vertex d'un quart plus long que large à la base, noir entre les yeux, arrondi en avant, noir en dessus, les bords latéraux carénés, jaunâtres, offrant au milieu un point jaunâtre. Les impressions frontales antérieures noires. Front aussi long que le clypeus, rétréci en haut entre les yeux, également arrondi vers le bas, plan, les carènes

latérales peu relevées; carène médiane distincte; dans la partie supérieure du front un triangle noir prolongé vers le bas sur le clypeus. Suture clypéale en forme de Ω offrant de chaque côté une tache foncée. Clypeus d'un jaune ferrugineux; front plus foncé. Antennes brunes. Rostre dépassant les hanches postérieures, noir à l'extrémité. Pronotum jaunâtre, noir sous les yeux. Écusson brun de poix avec des carènes d'un jaune ferrugineux. Élytres deux fois aussi longs que l'abdomen, dépassant de beaucoup celui-ci, hyalins à nervures d'un brun de poix, couverts de granules noirs, mais devenant jaunes en plusieurs points. La nervure du bord sutural est colorée en jaune en deux endroits. Nervures transversales foncées, bordées de brun. Stigma en forme de triangle allongé, brun, jaune en avant. Ailes hyalines, à nervures brunes. Corps brun, les bords des segments plus clairs. Vagina remarquablement longue, dirigée en ligne droite vers le bas. Pattes brunes, les cuisses et les tibias avec des lignes longitudinales foncées.

♂ ♀. Longueur du corps : 6 millimètres; avec les élytres, 10 millimètres. Éthiopie méridionale, Kounhi, Tchaffanani, en avril.

Hysteropterum solidum nov. sp.

Espèce assez grande, de couleur jaune pâle, sans marques foncées sur le dos. Vertex étroit, quatre à cinq fois aussi large que long dans son milieu, beaucoup plus court au milieu que sur les côtés, le bord antérieur droit. Front nettement plus long que large, rectangulaire, non rétréci vers le haut, plan, avec une carène médiane distincte, qui paraît abrégée vers le bas. Clypeus caréné au milieu, avec des traits transversaux foncés sur les côtés. Antennes courtes, leur deuxième article noir à l'extrémité. Sur le côté de la tête existe un point noir dans l'angle antérieur du front et une petite tache noire marginale en avant des yeux, ce qui distingue particulièrement cette espèce. Pronotum étroit, avancé en avant en forme de lobe, peu profondément sinué en arrière. Écusson deux fois aussi long que le pronotum, plan en dessus, avec des carènes latérales peu distinctes. Les élytres bombés, leur bord costal fortement incurvé, en forme de cloche, dirigés vers le bas, non repliés en dedans, tronqués obliquement au bout, de sorte que l'angle apical fait saillie en arrière. Élytres transparents, notamment sur les côtés, brillants, unicolores; nervures pas très saillantes, mais densément ramifiées; avant l'extrémité une ligne courbe distincte, qui se continue dans la nervure costale. De nombreuses nervures transversales serrées au bord costal. Ailes absentes. Dessous d'un brun jaune; dos tacheté de brun. Pattes jaune brunâtre, les cuisses et les tibias en particulier sur les parties planes finement tachetés de noir. Les extrémités des épines des tibias postérieurs sont noires.

♀. Longueur : 6 millimètres; largeur : 4 millimètres. Afrique orientale, mont Nyro.

Platypleura Rothschildi nov. sp.

Très semblable au *P. deusta* Thunbg. Corps vert, à dessin noir, revêtu d'une pubescence grise courte et de poils noirs longs et denses. La tête est plus étroite que la base du pronotum, le vertex arrondi en avant, non saillant. Les deux ocelles d'un rouge rubis, rapprochés l'un de l'autre, se trouvent dans une tache transversale noire, de laquelle part une étroite bande se rendant au bord interne de l'œil. Front convexe, avec un sillon longitudinal sur la ligne médiane, velu de poils bruns et noirs. Pronotum saillant en angle obtus sur les côtés; en dessus, sur la ligne médiane, une bande longitudinale noire comprenant une courte ligne longitudinale claire. Sillons du pronotum noirs. Écusson avec deux taches noires triangulaires au milieu du bord antérieur, et, de chaque côté, deux traits longitudinaux courts, dont l'externe est plus long que l'interne; derrière celui-ci un point à proximité de la croix scutellaire. Croix scutellaire verte, précédée de deux points noirs. Abdomen conique, noir, les bords postérieurs ciliés de petits poils gris argentés; en outre, tout le corps est couvert de longs poils noirs. Le dernier segment dorsal d'un blanc de craie, noir au milieu, lisse. Segment génital noir. Élytres marqués de brun, de noir, de gris et de blanc; la couleur fondamentale semble être le blanc grisâtre; la base et le clavus sont d'un brun jaune; une tache carrée blanche se trouve à peu près au milieu de la cellule subcostale, et une tache blanche plus grande, derrière l'extrémité du clavus; deux ou trois plus petites taches blanches sont éparses au bord marginal; toutes les nervures sont d'un jaune d'ocre; dans les cellules apicales trois petites taches blanches qui ont l'aspect de points géminés. Ailes d'un jaune d'ocre, d'un brun foncé seulement à l'extrémité, les nervures jaune d'ocre prédominant; champ anal d'un jaune d'ocre, avec une tache blanche au bord antérieur; tout le bord apical avec un filet blanc hyalin extrêmement étroit. Dessous brun, ou d'un vert brun sale. Pattes vert sale, les tarses d'un brun de poix tirant sur le noir. Le bord postérieur du dernier segment abdominal de la femelle dentelé au milieu.

Longueur du corps : 29 millimètres; envergure : 90 millimètres. Afrique orientale; lac Rodolphe. Une femelle.

Platypleura argus nov. sp.

Semblable à *P. Rothschildi*, mais plus petit. Corps, notamment l'abdomen, couvert d'une pubescence grise et offrant en outre un petit nombre de longues soies noires. La couleur grise des élytres est prédominante, la couleur jaune d'ocre manque totalement et les taches blanches sont très petites et faibles. Sur l'écusson on trouve, au lieu du triangle noir, une marque en forme de V, et dans celle-ci une tache médiane en forme d'ancre. Le champ anal des ailes n'est pas d'un jaune d'ocre pur; il est coloré en brun clair en arrière au bord externe. L'abdomen est velu, le bord posté-

rieur de son dernier segment est moins profondément échancré au milieu que chez l'espèce précédente. Semblable pour le reste à celle-ci.

♀. Longueur du corps : 27 millimètres; envergure : 80 millimètres. Afrique orientale, mont Nyro.

Inymana Bouvieri nov. sp.

Jaune pâle. Tête petite, aussi large (yeux compris) que le bord antérieur du pronotum. Front triangulairement convexe, vu de côté, tronqué à angle obtus, la partie supérieure de l'angle obtus convexe, la partie inférieure presque concave. Un sillon médian étroit sur la moitié supérieure du front, les côtés de celui-ci avec des sillons transversaux superficiels. Clypeus triangulaire. Rostre court. Antennes sétiformes, leurs deux premiers articles épais et presque d'égale longueur, les cinq autres articles longs, sétiformes. Pronotum plus large que long, ses côtés parallèles, les angles postérieurs lobés et saillants, tronqués transversalement, ce qui rend le bord postérieur plus large que le bord antérieur; de chaque côté, sur l'espace plan, trois traits bruns dans les sillons du pronotum. Écusson avec deux traits longitudinaux bruns et courts situés en avant et au milieu; de chaque côté un trait longitudinal plus large, triangulaire, brun, interrompu par un signe clair en forme de veine; deux points bruns en avant de la saillie cruciforme, qui est légère. Élytres aussi longs que l'abdomen, hyalins, les nervures jaune pâle; nervures apicales plus foncées, la nervure marginale interne du clavus noire. Ailes hyalines à nervures brunes. Abdomen conique, armé à l'extrémité de trois épines dressées, entre lesquelles se trouve l'anus. Opercule petit, semi-circulaire; épine coxale petite, mince et recourbée en forme de crochet.

♂. Longueur : 18 millimètres; envergure : environ 29 millimètres. Lesammise, Rendilé, en mars. Un exemplaire.

NOUVEAUX INSECTES DU HOUILLER DE COMMENTRY,

PAR M. FERNAND MEUNIER.

AVEC 12 FIGURES.

INTRODUCTION.

Dans des notes antérieures⁽¹⁾ et les *Nouvelles recherches*⁽²⁾, j'ai fait connaître plusieurs Insectes houillers non décrits par feu Ch. Brongniart, ou

⁽¹⁾ *Bulletin du Muséum d'histoire naturelle*, 1907, 1908, 1909, 1910.

⁽²⁾ *Ann. de paléontologie*, t. IV, Paris, 1909.